

ISSN 1018 - 8681

**Psikiyatri ve Nörolojik
Bilimler Dergisi**



DÜŞÜNEN ADAM

Cilt: 9 Sayı: 2 Yıl: 1996

**Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi
Bilimsel Yayınıdır**

DEPRESYONDAN ÇIKIŞ



Fluvoksamin
FAVERIN®

BİLEŞİMİ: Her tablette Fluvoksamin maleat 50 mg **ÖZELLİKLERİ:** FAVERİN, belirli depresif hastalıkların tedavisinde kullanılan psiko trop bir preparattır. Beyin nöronlarının serotonini tekrar almalarını inhibe etmek suretiyle etkisini gösterir. Bu sırada nöradrenerjik olayları etkilemez. FAVERİN iyi tolere edilir, bu nedenle, hem kısa süreli, hem de idame tedavisinde kullanılabilir. Yaşlılarda özel olarak gerçekleştirilen güvenlik ve etkinlik çalışmaları, bu bakımdan, toplum geneline oranla herhangi bir fark göstermemiştir. FAVERİN'in stimulan ya da sedatif etkisi yoktur. Psikomotor yetenekleri olumsuz yönde etkilemez ve antikolinerjik etkiler göstermez. FAVERİN'in hastadaki intihar eğilimi duygularını ortadan kaldırmada yararlı olduğu kanıtlanmıştır, bu etki tedavinin ilk haftasında kendini gösterir. FAVERİN, kalp üzerinde olumsuz klinik etkiler göstermez ve postüral hipotansiyona neden olmaz. **KULLANILDIĞI YERLER:** FAVERİN, devamlı olarak kendini kötü hissetme, psikomotor faaliyetlerde bozulma ve psikosomatik yakınmalarla birlikte bulunan depresif hastalıkların tedavisinde kullanılır. **KULLANILIŞ ŞEKLİ:** Etkili günlük doz, genellikle 100-200 mg arasında değişir ve her hastadan alınan cevaba göre düzenlenerek günde 300 mg'a kadar yükseltilebilir. Önerilen en düşük başlangıç dozu günde 100 mg'dır. Günlük doz bir defada terchen akşamları verilebilir. 150 mg'ı aşan günlük toplam dozların iki, üç kısma bölünerek verilmesi uygun olur. FAVERİN tabletleri suyla çiğnenmeden yutulmalıdır. **KONTRENDİKASYONLARI:** Preparatın etken maddesine aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır. **YAN ETKİLERİ:** FAVERİN, iyi tolere edilen bir preparattır. Depresif hastalık vakalarında çoğu zaman bulanık görme, ağız kuruması gibi vejetatif sinir sistemine ait belirtiler vardır. Fluvoksamin tedavisi sırasında yan etki olarak bulantı ve bazen kusma görülebilir. Bu belirtiler genellikle tedavinin ikinci haftasında azalır. Uyuklama, kabızlık, ajitasyon, iştahsızlık ve tremor, FAVERİN ile yapılan klinik çalışmalar sırasında bildirilen yan etkiler arasındadır. **TİCARİ ŞEKLİ** Faverin 50 mg: Her kaplanmış tablette 50 mg fluvoksamin maleat içeren 30 tabletlik ambalajlarda. Reçete ile satılır.

Solvay Duphar B. V. Weesp - Hollanda lisansı ile

Ruhsat sahibi ve üretim yeri

İlçeczacıbaşı

Daha fazla bilgi için kuruluşumuza başvurunuz.

Eczacıbaşı
İlac Pazarlama A.Ş.

Büyükdere cad. 185 80710 Levent, İstanbul

Bazıları için yaşam, size geldiği anda başlar...



Hastanız için bir huzur, sizin için bir kıvanç!



- Güçlü antidepresan etki gösterir
- Aktif ve çalışan hastanın antidepresanıdır
- Yaşlı hastanın antidepresanıdır
- Anksiyolitik etki gösterir
- Kognitif ve psikomotor fonksiyonları olumlu etkiler
- Çok iyi tolere edilir



AURORIX[®] Roche
moklobemid



Yaşasın yaşamak!

Bileşimi: Moklobemid **Özellikleri, etkileri:** Moklobemid, A tipi monoaminooksidazın reversibl inhibitörüdür. Ruhsal durumu düzeltici ve psikomotor aktiviteyi artırıcı etkisinin bir sonucu olarak AURORIX distri, bitkinlik, yaşam isteğinin kaybolması ve dikkati yoğunlaştırma yeteneğinin zayıflaması gibi semptomların giderilmesinde etkili olur. AURORIX sedasyona neden olmaz. AURORIX uyanıklık durumunu bozamaz ve iyi tolere edilir. Karaciğer ya da kalbe toksik bir etki gözlenmemiştir. **Endikasyonları:** Depresif sendromların tedavisinde. **Standart Doz:** Depresyonun şiddetine göre günde 300-600 mg iki veya üçe bölünerek verilir. **Uyarılar:** AURORIX ilaca karşı duyarlılığın bilindiği hallerde ve yeterli klinik deneyim alınmasından dolayı çocuklarda kullanılmamalıdır. Baskın klinik özelliği ajitasyon olan depresif hastalarda AURORIX bir sedatifle birlikte kullanılmalıdır. Yoğun dikkat gerektiren etkinliklerde AURORIX performans bozukluğuna yol açmaz, ancak tedavinin erken dönemdeki tepkilerin şahıstan şahısa değişebileceği göz önünde tutulmalıdır. **Gebelikte kullanım:** Genel kural olarak kabul edilen, gebeliğin erken döneminde, gerekmedikçe her türlü ilacı kullanmaktan kaçınma ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. **İstenmeyen etkileri:** Plaseboya göre istenmeyen etkilerin sıklığı %5 den fazla değildir. Uyku bozukluğu, sersemlik, bulantı ve baş ağrısı arastırılan etkileridir. **Etkileşimler:** Simeridin moklobemid in metabolizmasını uzatır. Moklobemid alkolle etkileşime girmez. **Aşırı doz:** Aşırı doz tedavisi öncelikle vital fonksiyonların sürdürülmesini hedeflemelidir. **Ticari şekli:** 100 mg, 30 adet bisterde Ocak 1996 / KDV Dahil Per. Sat. Fl.: 100 mg 1.118.000 TL, 150 mg 1.567.000 TL. **Reçete ile satılır.** Daha detaylı bilgi firmamızdan sağlanabilir. Roche Mustahzarları Sanayi A.Ş. PK 16 80622 Levent-Istanbul

depreks®

Fluoksetin
ANTİDEPRESAN



"Günlük Yaşamdan Kopmadan"

- Güçlü ve etkin,
- Güvenli,
- Aşırı dozda geniş emniyet aralığına sahip,
- İyi tolere edilen,
- Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerektirmeyen,
- Günde tek doz uygulanan SSRI grubu bir antidepresandır.

FORMÜLÜ : Bir DEPREKS kapsül, 20 mg Fluoksetin'e eşdeğer Fluoksetin hidroklorür içerir.**ENDİKASYONLARI :** DEPREKS kapsül,depresyon ve buna bağlı olarak anksiyete tedavisinde kullanılır.**KONTRENDİKASYONLARI :** DEPREKS kapsülün bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş veya duyarlılık durumlarında kontrendikedir.**UYARILAR / ÖNLEMLER :** Fluoksetin,MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalı ve MAO inhibitörü bırakıldıktan en az iki hafta sonra Fluoksetin kullanımına başlanmalıdır.Fluoksetin'in kesilmesinden en az 5 hafta sonra MAO inhibitörü kullanımına geçilmelidir.Fluoksetin kullanımı sırasında, döküntü ya da benzer allerjik durumların görülmesi halinde ilaç kesilmelidir.Fluoksetin ile tedavi gören hastaların 30 - 15'inde anksiyete ve sinirsel gerilim görülmüş olup bu semptomlar, hastaların %5'inde tedavinin kesilmesini gerektirmiştir.Fluoksetin ile tedavi gören ve özellikle normal klorun altındaki hastalarda belirgin kilo kaybı görülebilir.Fluoksetin,alkolle birlikte kullanılmamalı, nöbeti hikayesi olan hastalarla birlikte kullanılmamalıdır.Öznel hikayesi olan hastalarda özellikle kullanılmamalıdır.Öznel hikayesi olan hastalarda özellikle kullanılmamalıdır.Merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olanlar ile bu rahatsızlığı karşı diğer ilaçların kullanıldığı durumlarda, Fluoksetin kullanan hastalar yakından izlenmelidir. Diğer psikoaktif ilaçlar gibi, yorgunluk, düşünme veya motor kapasiteyi etkileyebileceği unutulmamalı ve hastalar bu konuda uyarılmalıdır. Hamileler ve emziken annelerde kesin olarak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Fluoksetin'in çocuklarda güvenli kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur.**YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :** Fluoksetin kullanımı ile ilgili olarak en çok ortaya çıkan yan etkiler şunlardır: Sinirsel problemler, gerilim ve uykusuzluğa içine alan anksiyete, uyku hali ve baş ağrısı veya asteni, tremor,terleme,deri döküntüleri,ateş basması, sık idrara çıkma, seksüel disfonksiyon (erectil, nazal konjesyon,görme bozukluğu,gastrointestinal rahatsızlıklar,anoreksi,bas dönmesi. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER : MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.Triptolan ile birlikte kullanıldığında ajitasyon,tedirginlik ve gastrointestinal rahatsızlıklar oluşabilir.Bazı kişilerde diazepamın yanılma süresini uzatabilir. Birlikte kullanılması durumunda litium düzeyini düşürebilir. Diğer antidepresanlarla aynı zamanda kullanımı, bu ajitasyonun stabil kan düzeyini iki katına çıkarabilir.Antikoagulan ve dijital gibi yüksek oranda proteine bağlanan ilaçlarla birlikte kullanılacak ise dikkatli olmalıdır.Sentral sinir sistemini aktive eden ilaçlarla birlikte kullanımı sistemik olarak artırılabilmektedir.**KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :** Önerilen doz günde bir kez aç veya tok karına alınır (tercihen sabah veya öğlen) bir kapsüldür.20 mg/gün'ü aşan dozlar kullanılacak ise, 80 mg/gün'ü aşmayacak biçimde ve ikiye bölünerek kullanılması önerilir.**RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ :** ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. ve TİC.A.Ş. Yefa-İstanbul. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. Reçete ile satılır.Perakende satış fiyatı :726.000 TL (Nisan 1995)

ABİ **ABDİ İBRAHİM**
İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



DÜŞÜNEN ADAM

Psikiyatri ve Nörolojik
Bilimler Dergisi

The Journal of Psychiatry
and Neurological Sciences

Cilt / Volume:9 Sayı / Number:2 1996

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesinin Süreli Bilimsel Yayınıdır

Sahibi

Doç. Dr. Arif Verimli
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi Başhekimisi

Editör

Doç. Dr. Oğuz Arkonaç

Yardımcı Editörler

Dr. Nihat Alpay
Doç. Dr. M. Emin Ceylan

Teknik Sorumlu

Dr. Nihat Alpay

Yazışma adresi/Corresponding address

Dr. Nihat Alpay

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi 34747 Bakırköy

İstanbul / Türkiye

Tel: (0212) 543 65 65

Fax: (0212) 572 95 95

İnternet: Ruhsinir @ magnet.com.tr.

Hazırlık ve Baskı

Logos Yayıncılık Tic. A.Ş.



Yıldız Posta Cad. Sinan Apt. No: 36
D. 66-67 80280-Gayrettepe-İstanbul
Tel: 288 05 41-288 50 22 Fax: 211 61 85

Üç ayda bir yayınlanır.
Ücretsiz olarak dağıtılır.

BİLİMSEL KURUL

Uz. Dr. Nihat Alpay, Doç. Dr. Oğuz Arkonaç, Doç. Dr. Baki Arpacı,
Doç. Dr. Ali N. Babaoğlu, Prof. Dr. Salih Battal, Doç. Dr. Sevim Baybaş,
Doç. Dr. Duran Çakmak, Doç. Dr. Hüsnü Erkmén, Prof. Dr. Ahmet Göğüş,
Prof. Dr. Hamit Z. Gökalp, Prof. Dr. Cengiz Güleç, Prof. Dr. Erdal Işık,
Doç. Dr. Cem İlnem, Doç. Dr. Dursun Kırbas, Prof. Dr. Özcan Köknel,
Prof. Dr. Savaş Kültür, Prof. Dr. Erhan Oğul, Dr. Zeki Oral,
Prof. Dr. Turan Örnek, Doç. Dr. Salih Yaşar Özden, Prof. Dr. Sedat Özkan,
Prof. Dr. Orhan Öztürk, Prof. Dr. Refet Saygılı, Prof. Dr. Ayhan Songar,
Prof. Dr. Coşkun Şarman, Prof. Dr. Bilgen Taneli, Doç. Dr. Nevzat Tarhan,
Dr. Niyazi Uygur, Prof. Dr. Mehmet Ünal, Dr. Muharrem Yaman,
Doç. Dr. Murat Taşkın, Op. Dr. Halil Toplamaoğlu, Doç. Dr. Arif Verimli

İÇİNDEKİLER

Şizofrenide Negatif Belirtilerin Tedavisinde Bir Dopamin Agonisti Olan Bromokriptin'in Etkinliği	
M. KULOĞLU, A. ÇAYKÖYLÜ, İ. KIRPINAR, E. ÖZATALAY	4
Adölesan Yaşta 17 Disosiyatif Kimlik Bozukluğu (çoğul kişilik) Olgusunun Sosyodemografik, Klinik Özellikleri ve Travmatik Yaşantı Öyküleri	
S. ZOROĞLU, İ. YARGIÇ, H. TUTKUN, Ü. TÜZÜN, V. ŞAR	9
Tedaviye Dirençli Şizofreni: Bir gözden geçirme	
A. COŞKUN, H.A. SAVAŞ, O. ARKONAÇ	16
Geç Başlangıçlı Şizofreni: Bir gözden geçirme	
H. DENİZ, C. İLNEM, F. YENER	26
Postpartum Psikoz Gelişen Kadınların Demografik ve Klinik Özellikleri	
İ. KIRPINAR, A. ÇAYKÖYLÜ, İ. COŞKUN, H. ÖZER	35
Erken Boşalma Tedavisinde Fluoxetine'in Etkinliği: Çift-kör, Plasebo Kontrollü Bir Çalışma	
H. KARA, S. AYDIN, M.Y. AĞARGÜN, Ö. ODABAŞ, Y. YILMAZ	41
Yatarak Sağaltım Gören Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri: Yatış Süresini Etkileyen Faktörler	
S.H. ARSLAN, Y.E. EVLİCE, Z.N. ALPARSLAN, R.S. DİLER	44
Zimmet Suçluları Hakkında Psikososyal İnceleme	
F. AŞICIOĞLU, B. ÜGE	50
Cinsel Roller ve Cinsel Mitler	
K. KORA, A. KAYIR	55
Multipl Sklerozlu 113 Olgunun Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Analizi	
A. SOYSAL, A. ŞEN, İ. KOÇ, S. ÇETİN, F. ÖZER, B. ARPACI	59