

Volume: 26, Number: 4, December 2013


ISSN 1018 - 8681

DÜŞÜNEN ADAM

The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences



Şizofreni tedavisinde hayata etkin dokunuş¹



AYLIK TEDAVİ¹

XEPLION®
paliperidon palmitat

Referanslar: 1. Citrome. Paliperidone palmitate – review of the efficacy, safety and cost of a new second-generation depot antipsychotic medication. Int J Clin Pract 2010;64:216–239. 2. Xeplion® Kısa Prospektüs Bilgisi.

Kısa Prospektüs Bilgisi
XEPLION® 25 mg / 50 mg / 75 mg / 100 mg / 150 mg LM, enjeksiyon için uzun salımlı süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör. **FORMÜLÜ:** XEPLION 39 mg (25 mg paliperidona eşdeğer), 78 mg (50 mg paliperidona eşdeğer), 117 mg (75 mg paliperidona eşdeğer), 156 mg (100 mg paliperidona eşdeğer), 234 mg (150 mg paliperidona eşdeğer) Paliperidon palmitat içerir. **ETKİ MEKANİZMASI:** Paliperidon palmitat, paliperidona hidrolik olar. Paliperidon, daha çok serotonerjik 5-HT_{2A} antagonizik aktiviteyi olan merkezi etkili dopamin D₂ antagonistidir. **ENDİKASYONLAR:** Şizofreni tedavisi ve şizofreni semptomlarının tekrarıyla önlenmesinde endikedir. **POZOLOJİ VE UYGULAMA ŞEKLİ:** XEPLION® un önerilen başlangıç dozu, tedavinin birinci gününde 150 mg ve bir hafta sonra (8. gün) 100 mg'dır (her iki de deltoid kas içine uygulanır). Önerilen aylık idame dozu 75 mg'dır. Önerilen 25 mg ila 150 mg'lık doz aralığında hastanın bireysel tolerabilitesi ve veya etkililiğe göre bazı hastalar daha düşük ya da daha yüksek dozlardan yarar görebilir. İkinci doz takiben aylık idame dozları deltoide veya gluteale kas içine uygulanabilir. Sadece intramüsküler kullanım için hazırlanmıştır. Kas içine yavaş ve derin olarak enjekte edilmelidir. Bugüne kadar paliperidon ya da risperidon kullanmamış hastalar için XEPLION® ile tedaviye başlanmadan önce, oral paliperidon veya oral risperidonun tolerabilitesi kanıtlanmalıdır. XEPLION® 18 yaşın altındaki çocuklarda çalışmamıştır. Genel olarak, böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda, XEPLION® un önerilen dozu, böbrek fonksiyonu normal olan genç erişkin hastalarda önerilen dozla aynıdır. **KONTRENDİKASYONLAR:** Paliperidon palmitata veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı ağır duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Paliperidon, risperidonun aktif bir metaboliti olduğu için XEPLION® risperidona karşı bilinen ağır duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. **UYARILAR VE ÖNLEMLER:** Diğer antipsikotiklerle olduğu gibi, bilinen kardiyovasküler hastalığı olan veya ailesinde QT uzama öyküsü olan hastalarda ve QT aralığının uzattığı düşünülen diğer ilaçlar ile birlikte kullanılacağı durumlarda, dikkatli olunmalıdır. Nöroleptik maliğin sendromu (NPS), paliperidon da dahil; antipsikotik ilaçlar ile oluşturduğu bildirilmiştir. Eğer tardif diskinezinin bulgu ve semptomları ortaya çıkarsa, XEPLION® da dahil olmak üzere tüm antipsikotik ilaçların kesilmesi değerlendirilmelidir. Diğer antipsikotik ilaçlarla olduğu gibi, diyabeti olan ve diabetes mellitus gelişmesi açısından risk faktörleri taşıyan hastalarda, uygun klinik izleme önerilir. Paliperidon, alfa-blokör aktivitesinden dolayı bazı hastalarda ortostatik hipotansiyonu indükleyebilir. XEPLION®, diğer antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi nöbet öyküsü olan hastalarda veya nöbet eşliğinde potansiyel olarak düşüren diğer kopulları bulundugu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Paliperidonun plazma konsantrasyonu, böbrek yetmezliği olan hastalarda artmıştır ve bu nedenle hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Orta derece veya ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi <50 ml/dak.) XEPLION® önerilmez. Paliperidon, ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C) incelenmemiştir. Paliperidon, bu tür hastalarda kullanılıyorsa dikkatli olunması önerilir. Konvansiyonel ve atipik antipsikotik ilaçlar demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastaların tedavisinde kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olmaktadır. XEPLION®, imne aşından risk faktörleri taşıyan demans yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Parkinson hastalığı veya Lewy cisimcikli demanslı hastalara XEPLION® da dahil olmak üzere antipsikotik ilaçlar reçete edilirken doktorlar yarar risk değerlendirmesi yapmalıdır. Alfa-adrenerjik blokör etkileri olan antipsikotik ilaçların (risperidon dahil), priapizmi indüklediği bildirilmiştir. Ağrı egzersiz yapmak, ağır sıcak maruziyet, antikoagüvan aktivitesi olan ilaçların eş zamanlı uygulanması veya dehidratasyon bulunması gibi çok vücut ısısında yükselmeye katkıda bulunabilecek koşulları olan hastalara XEPLION® reçete edilirken dikkatli olunması önerilir. YTE için tüm olası risk faktörleri, XEPLION® ile tedaviden önce ve tedavi süresince tanımlanmalı ve koruyucu önlemler alınmalıdır. Paliperidon palmitat olası prolaktine bağlı tümörü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Atipik antipsikotik kullanımla kilo alımı gözlemlenmiştir. Kilonun klinik olarak izlenmesi tavsiye edilmektedir. Xeplion dahil olmak üzere antipsikotik ajanlarla lökopeni, nötropeni ve agranülositoz olayları bildirilmiştir. Paliperidon ile yapılan klinik öncesi çalışmalarda, antiemetik etki gözlemlenmiştir. Bu etki, eğer insanlarda oluşursa, başgörsün, bulantı, kusma, iştahsızlık ve beyin tümörü gibi durumları veya belli ilaçların aşırı doz bulgu ve semptomlarını maskeleyebilir. XEPLION® un kan damarı içine kazı ile enjekte edilmesinin önlenmesi için dikkatli olunmalıdır. Gebelik kategorisi C'dir. XEPLION®, kesin gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Paliperidon anne sütü ile atılmaktadır (süte geçmektedir). XEPLION® emirme döneminde kullanılmamalıdır. XEPLION®, zihin açıklığı gerektiren aktivitelere engel olabilir ve görsel etkileri neden olabilir. **BASILICA YAN ETKİLER / ADYERS ETKİLER:** Klinik çalışmalarda en sık bildirilen adyvers ilaç reaksiyonları: insomniya, baş ağrısı, kilo alımı, enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, alıtsiyon, somnolans, akatizi, bulantı, konstipasyon, sersemlik, tremor, kusma, iştahsızlık, diare ve taşikardidir. **BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.** **BASILICA İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:** XEPLION® un QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar, örn: sınıf IA antiaritmikler (örn: kinidin, disopramid) ve sınıf III antiaritmikler (örn: amiodron, sotalol), bazı antihistaminikler, bazı diğer antipsikotik ilaçlar ve bazı antimalaryaller (örn: meflokin) ile birlikte reçete ederken dikkatli olunması önerilir. Paliperidonun, stokrom P-450 izoenzimleri ile metabolize olan ilaçlar ile klinik açıdan önemli farmakokinetik etkileşimlere neden olması beklenmemektedir. **DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER:** Paliperidonun spesifik bir antidotu yoktur. Genel destekleyici önlemler uygulanmalıdır. Hava yolu açık tutulmalı, koruyucu ve yeterli oksijenasyon, ventilasyon sağlanmalıdır. Kardiyovasküler izlemeye hemen başlanmalı ve olası aritmiler için sürekli elektrokardiyografik izleme yapılmalıdır. Hipotansiyon ve deltaşım kollapsı, intravenöz sıvı ve/veya simpatomimetik ilaçlar gibi uygun önlemlerle tedavi edilmelidir. Ciddi ekserkizantemdeli semptomların varlığında antikoagüvan ilaçlar uygulanmalıdır. **GECİMSİZLİKLER:** Beyin tıbbi ürün veya serektisi ile karıştırılmamalı, intramüsküler uygulamaya direk olarak kit içindeki enjektörden yapılmalıdır. **SAKLAMA KOŞULLARI:** 25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Raf ömrü 24 aydır. **TICARI TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEYİYATI:** Paliperidon palmitata eşdeğer süspansiyonu ile kullanıma hazır piston tıplı ve uç başlıklı (bromobutyl lastik) bir enjektör (silik-olefin-kopolimeri), merkezi mavi renkli bir güvenlik iğnesi ve merkezi gri renkli bir güvenlik iğnesi içeren kit. **RUHSAT SAHİBİ ADI VE ADRESİ:** Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak Keleş Plaza No: 13 Kavacık, Beykoz-İstanbul Tel: 0216 538 20 00 Faks: 0216 538 24 99. **ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ:** Janssen Pharmaceutica N.V., Belçika **RUHSAT TARİHİ VE NO:** 1.08.2011. **Perakende satış fiyatı KDV dahil:** (22 Nisan 2013) 131/89 (50 mg), 465,50 TL. 131/90 (75 mg), 596,48 TL. 131/91 (100 mg), 727,57 TL. 131/92 (150 mg) 1.076,97 TL. **KUB yenilenme tarihi:** (04.01.2013) **REÇETE İLE SATILIR.** Daha geniş bilgi için Formdazba başvurunuz. www.janssen.com.tr

DÜŞÜNEN ADAM

The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences



Volume: 26, Number: 4, December 2013

Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences is included in the Scopus, Embase, EBSCO Academic Search Complete, EBSCO TOC Premier, CINAHL, CIRRIE, Index Copernicus, Cabell's Directory, ProQuest Academic Research Library, DOAJ, Summon Serial Solutions, Ulrich's Database, Open J-Gate, ScopeMed, Academic Journals Database, Citefactor, Türkiye Atf Dizini, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline and TÜBİTAK Türk Tıp Dizini.



This publication is printed on acid-free paper that meets the international standart ISO 9706: 1994 (Requirements for Permanence).
Bu yayında ISO 9706: 1994 uluslararası standartlarına uygun olarak asitsiz kağıt kullanılmıştır.

www.dusunenadamdergisi.org / ISSN: 1018-8681 (Print edition) / ISSN: 1309-5749 (Electronic edition)

DÜŞÜNEN ADAM

The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences



Volume: 26, Number: 4, December 2013

Editor / Yayın Yönetmeni

Cüneyt Evren, M.D., (İstanbul, Turkey)

Associate Editors / Yardımcı Yayın Yönetmenleri

Kürşat Altınbaş, M.D., (Çanakkale, Turkey)

Suat Küçükgöncü, M.D., (Massachusetts, USA)

Müge Bozkurt, M.D., (İstanbul, Turkey)

Editors for Statistics / İstatistik Editörleri

Serhat Çıtak, M.D., Ph.D., (İstanbul, Turkey)

Murat Erkran, M.D., (İstanbul, Turkey)

Linguistic Editors / Dil Editörleri

Samet Köse, M.D., (Nashville TN, USA)

Nesrin Tomruk, M.D., (İstanbul, Turkey)

Ejder Yıldırım, M.D., (İstanbul, Turkey)

Turkish Language Redactor / Türkçe Dil Düzeltmeni

Alp Aker, M.D., (İstanbul, Turkey)

English Language Redactor / İngilizce Dil Düzeltmeni

Osman Cigeroğlu, M.D., (İstanbul, Turkey)

International Advisory Board / Uluslararası Danışma Kurulu

Amit Bar-Or, M.D., (Montreal, Canada)

James Bell, M.D., (London, England)

Sumru Bilge-Johnson, M.D., (Akron, OH, USA)

Istvan Bitter, M.D., Ph.D., (Budapest, Hungary)

Wim van den Brink, M.D., (Amsterdam, The Netherlands)

Martin Brüne, M.D., (Bochum, Germany)

C. Robert Cloninger, M.D., (St. Louis, USA)

Nick Craddock, M.D., Ph.D., (Cardiff, UK)

Serdar Dursun, M.D., (Edmonton, Canada)

David L. Dunner, M.D., (Mercer Island, WA, USA)

Jon D. Elhaj, Ph.D., (Toledo, Ohio, USA)

Kostas N. Fountoulakis, M.D., (Thessaloniki, Greece)

Mark A. Frye, M.D., (Rochester, MN, USA)

David Greenberg, M.D., (Tel Aviv, Israel)

Tomas Hajek, M.D., Ph.D., (Halifax, Canada)

Ludwig Kappos, M.D., (Basel, Switzerland)

Siegfried Kasper, M.D., (Vienna, Austria)

Mario Maj, M.D., (Naples, Italy)

Peter R. Martin, M.D., (Nashville, TN, USA)

Pavel Mohr, M.D., Ph.D., (Prague, Czech Republic)

Hans Jürgen Möller, M.D., (Munich, Germany)

Henry A. Nasrallah, M.D., (Cincinnati, OH, USA)

Charles B. Nemeroff, M.D., Ph.D., (Miami, Florida, USA)

Dost Ongür, M.D., (Belmont, MA, USA)

Janusz Rybakowski, M.D., Ph.D., (Poznan, Poland)

Norman Sartorius, M.D., Ph.D., (Geneva, Switzerland)

Jair C. Soares, M.D., (Houston, USA)

Marc Schuckit, M.D., (San Diego, USA)

Maurício Tohen, M.D., (San Antonio, Texas, USA)

Jim Van Os, M.D., (Maastricht, Netherlands)

Joseph Zohar, M.D., (Tel Aviv, Israel)

National Advisory Board / Ulusal Danışma Kurulu

Ercan Abay, M.D., (Edirne)

Tamer Aker, M.D., (Kocaeli)

Köksal Alptekin, M.D., (İzmir)

E. Cem Atbaşoğlu, M.D., (Ankara)

Murat Atmaca, M.D., (Elazığ)

Omer Aydemir, M.D., (Manisa)

Göksel Bakaç, M.D., (İstanbul)

Işın Baral Kulaksızoğlu, M.D., (İstanbul)

Mustafa Bilici, M.D., (İstanbul)

Can Cimilli, M.D., (İzmir)

Mesut Çetin, M.D., (İstanbul)

Nesrin Dilbaz, M.D., (İstanbul)

Orhan Doğan, M.D., (İstanbul)

Ertuğrul Eşel, M.D., (Kayseri)

Peykan Gökalp, M.D., (İstanbul)

Ali Saffet Gönül, M.D., (İzmir)

Hasan Herken, M.D., (Denizli)

Figen Karadağ, M.D., (İstanbul)

Oğuz Karamustafaloğlu, M.D., (İstanbul)

Cengiz Kılıç, M.D., (Ankara)

İsmet Kırpınar, M.D., (İstanbul)

Numan Konuk, M.D., (İstanbul)

Levent Küey, M.D., (İstanbul)

Timuçin Oral, M.D., (İstanbul)

Ayşegül Özerdem, M.D., (İzmir)

Haluk Savaş, M.D., (Gaziantep)

Mehmet Sungur, M.D., (İstanbul)

Vedat Şar, M.D., (İstanbul)

Lut Tamam, M.D., (Adana)

Raşit Tükel, M.D., (İstanbul)

Hakan Türkçapar, M.D., (Ankara)

Aylin Uluşahin, M.D., (Ankara)

Alp Üçok, M.D., (İstanbul)

Özden Şükran Üneri, M.D., (Ankara)

Medaim Yanık, M.D., (İstanbul)

Mustafa Yıldız, M.D., (Kocaeli)

Papers and the opinions in the Journal are the responsibility of the authors.

Dergide yer alan yazılardan ve aktarılan görüşlerden yazarlar sorumludur.

This is a medical scientific journal, published quarterly in March, June, September, and December and distributed free.

Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında, yılda dört sayı olarak yayınlanan; tıbbi, bilimsel bir dergi olup, ilgililere ücretsiz dağıtılır.

Editorial Correspondence / İletişim

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery

Bakırköy 34747 İstanbul - Turkey

Phone / Telefon: +90 (212) 409 15 15 / 2111

Fax / Faks: +90 (212) 572 95 95

dusunenadam@dusunenadamdergisi.org

www.dusunenadamdergisi.org

Owner / Sahibi

The Journal is owned by Murat Ertemir, M.D., (İstanbul, Turkey) on behalf of Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery

Editor-in-Chief / Yazı İşleri Müdürü

Cüneyt Evren, M.D., (İstanbul, Turkey)

Publisher / Yayıncı

Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.

Cumhuriyet Caddesi 48/3B Harbiye 34367 İstanbul - Turkey

Phone / Telefon: +90 (212) 240 28 20 Fax / Faks: +90 (212) 241 68 20

e-mail / e-posta: yerkure@yerkure.com.tr

Printed in / Baskı

Ömür Matbaacılık A.Ş.

Beysan Sanayi Sitesi Birlik Çaddesi No: 20

Haramidere, Beylikdüzü 34524 İstanbul - Turkey

Phone / Telefon: +90 (212) 422 7600 pbx Fax / Faks: +90 (212) 422 46 00

Author(s) / Yazar(lar)

Guest Editorial / Misafir Editöryal

Martin DJ, Smith DJ	Cardiometabolic comorbidity in bipolar disorder / <i>Bipolar bozuklukta kardiyometabolik eşhastalanım</i>	315
---------------------	---	-----

Researches / Araştırmalar

1	Ciftci-Kaygusuz C, Arisoy O, Boztas MH, Sercan M	Comparison of first episode and recurrent major depression patients in terms of cognitive function / <i>İlke atak ve rekürren major depresyon hastalarının kognitif işlevler açısından karşılaştırılması</i>	320
2	Konkan R, Senormanci O, Guclu O, Aydin E, Erkiran M	Evaluating the subtypes of panic disorder by using principal component analysis / <i>Ana bileşenler analizi ile panik bozukluğu alt tiplerinin değerlendirilmesi</i>	333
3	Umut G, Ozturk-Altun Z, Danismant BS, Kucukparlak I, Karamustafalioglu N, Inem MC	The correlation of suicide attempt and suicidal ideation with insight, depression and severity of illness in schizophrenic patients / <i>Şizofreni hastalarında özkiyim girişimi ve özkiyim düşüncesinin, hastalık şiddeti, depresyon ve işgörü ile ilişkisi</i>	341
4	Evren C, Can Y, Yilmaz A, Ovali E, Cetingok S, Karabulut V, Mutlu E	Psychometric properties of the Drug Abuse Screening Test (DAST-10) in heroin dependent adults and adolescents with drug use disorder / <i>Madde Kötüye Kullanımı Tarama Testi'nin (DAST-10) eroin bağımlısı erişkinlerde ve madde kullanım bozukluğu olan ergenlerde psikometrik özellikleri</i>	351
5	Karsikaya S, Kavakci O, Kugu N, Guler AS	Post-traumatic stress disorder and anger in migraine patients / <i>Migren hastalarında travma sonrası stres bozukluğu ve öfke</i>	360
6	Dursun OB, Esin IS, Gulec M, Sener MT, Varol-Tas F, Beyhun NE, Godekli M	A possible cause of trauma for children in justice system of Turkey: attitudes of prosecutors and judges / <i>Türkiye'de adli sistemdeki çocuklar için muhtemel bir travma kaynağı: Hakim ve savcıların tutumları</i>	367

Brief Report / Kısa Araştırma

7	Asoglu M, Bulbul F, Altindag A	Evaluation of suicide attempts that referred to a university hospital emergency department / <i>Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran intihar girişimi vakalarının değerlendirilmesi</i>	376
---	--------------------------------	---	-----

Review / Derleme

8	Sengul C, Dilbaz N	Neurobiology, genetics and treatment of alcohol craving / <i>Alkol aşermesinin nörobiyolojisi, genetiği ve tedavisi</i>	381
---	--------------------	---	-----

Case Reports / Olgu Sunumları

9	Karahmet E	Overview of the psychiatric reflections of mobbing: two case reports / <i>İki olgu sunumu eşliğinde işyerinde yıldırmanın psikiyatrik yansımalarının gözden geçirilmesi</i>	388
10	Bulbul F, Demir B, Aksoy I, Alpak G, Unal A, Savas H	Electroconvulsive therapy in a major depression patient with arachnoid cyst / <i>Araknoid kisti olan majör depresyon vakasında elektrokonvülsif tedavi uygulaması</i>	392
11	Kilic-Coban E, Dogan VB, Dirik A	A cause of status epilepticus in Turkey: Isoniazide intoxication / <i>Ülkemizde bir status epilepticus nedeni: İzoniazid zehirlenmesi</i>	395
12	Elboga G, Bulbul F, Unal A, Alpak G, Elboga U, Ozkaya M, Savas H	Seventy-two months ongoing nephrogenic diabetes insipidus after discontinuation of lithium: a case report / <i>Lityum kesilmesinden sonra 72 ay devam eden nefrojenik diabetes insipidus: Olgu sunumu</i>	398

Letter to the Editor / Editöre Mektup

13	Guzel-Ozdemir P, Selvi Y	A rarely diagnosed sleep disorder: narcolepsy / <i>Nadir tanı konulan bir uyku bozukluğu: Narkolepsi</i>	402
----	--------------------------	--	-----